

## CANNA HYDRO HARD WATER

## ПРОГРАМА НА ОТГЛЕЖДАНЕ



ОНЛАЙН  
РЪКОВОДСТВО ЗА  
ОТГЛЕЖДАНЕ

ДНИ И СЕДМИЦИ  
СВЕТЛИНА / ДЕН В ЧАСОВЕ

ВЕГЕТАТИВНА ФАЗА				ЦЪФТЕЖНА ФАЗА						
ВКОРЕНЯ- ВАНЕ	I	II		I			II	III	IV	
Δ1-5	Δ6-25	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
18	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Дози в мл на 10 л

CANNA HYDRO VEGA A (HW)	24 - 31	28 - 35	28 - 35	28 - 35							
CANNA HYDRO VEGA B (HW)	24 - 31	28 - 35	28 - 35	28 - 35							
CANNA HYDRO FLORES A (HW)					28 - 35	28 - 35	28 - 35	28 - 35	24 - 32	21 - 28	
CANNA HYDRO FLORES B (HW)					28 - 35	28 - 35	28 - 35	28 - 35	24 - 32	21 - 28	
CANNA RHIZOTONIC	40	20	20	20	5	5	5	5	5		
CANNAZYM		25	25	25	25	25	25	25	25	25 - 50 *	25 - 50
CANNABOOST			20 **	20	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40
CANNA PK 13/14								15			
CANNA FLUSH									40		40

mS/cm

ЕС ВОДА	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
ЕС ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА	1,5 - 1,9	1,7 - 2,1	1,7 - 2,1	1,7 - 2,1	1,7 - 2,1	1,7 - 2,1	1,7 - 2,1	2,0 - 2,4	1,4 - 1,9	1,2 - 1,7	
ЕС ОБЩО	2,1 - 2,5	2,3 - 2,7	2,3 - 2,7	2,3 - 2,7	2,3 - 2,7	2,3 - 2,7	2,3 - 2,7	2,6 - 3,0	2,0 - 2,5	1,8 - 2,3	0,6

Тази програма за отглеждане е предназначена за цъфтящи или плододаващи растения, започнали от резник или разсад на възраст от една седмица. Продължителността на всяка фаза може да варира в зависимост от вида.

\* Удвоете дозата CANNAZYM до 50 мл/10 л, ако субстратът се използва повторно.

\*\* Увеличете CANNABOOST до максимум 40 мл/10 л по време на цъфтежната за допълнителна сила.

За по-дълга фаза на растеж, повторете препоръчителните дози от Вегетативна фаза I (Δ6-25).

За по-дълга фаза на цъфтеж, повторете препоръчителните дози от Цъфтежна фаза I (W3-W5).

Добавете CANNA PK 13/14 в периода 3-4 седмици преди прибиране на реколтата.

Препоръчителното pH е между 5,2 и 6,2.

